

2017 年度 入学試験問題

数 学

(試験時間 15:20~17:00 100分)

1. 解答用紙には、記述解答用紙とマーク解答用紙の2種類がありますので注意してください。
2. 解答は、必ず解答欄に記入およびマークしてください。解答欄以外への記入およびマークは無効となりますので注意してください。
3. 解答は、HBの鉛筆またはシャープペンシルを使用し、訂正する場合は、プラスチック製の消しゴムを使用してください。特に、マーク解答用紙には鉛筆のあとや消しくずを残さないでください。
4. 解答用紙を折り曲げたり、汚したりしないでください。また、マーク解答用紙を記述解答用紙の下敷きに使用しないでください。
5. 解答用紙には、必ず受験番号と氏名を記入およびマークしてください。
6. マーク解答用紙への受験番号の記入およびマークは、コンピュータ処理上非常に重要なので、誤記のないよう特に注意してください。
7. 満点が100点となる配点表示になっていますが、数学科は満点が200点であり、各問の配点は2倍となります。

I 次の問題文の空欄にもっとも適する答えを解答群から選び、その記号をマーク解答用紙にマークせよ。ただし、同じ記号を2度以上用いてもよい。(20点)

複素数平面上の点 $P(\alpha)$ が、原点 $O(0)$ を中心とする半径 1 の円 C 上にある。 α の偏角を θ とし、 $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$ であるとする。また、点 $Q(\beta)$ 、点 $R(\gamma)$ はそれぞれ

$$\beta^3 = \alpha, \quad 0 \leq \arg \beta < \frac{2\pi}{3}$$

$$\gamma^3 = \alpha, \quad \frac{4\pi}{3} \leq \arg \gamma < 2\pi$$

をみたす点であるとする。

複素数 β 、 γ の絶対値はどちらも 1 だから、点 Q 、 R は円 C 上の点である。さらに β 、 γ の偏角はそれぞれ 、 である。よって β 、 γ を極形式で表すと

$$\beta = \cos \text{ } + i \sin \text{ }$$

$$\gamma = \cos \text{ } + i \sin \text{ }$$

となる。 $\triangle PQR$ の面積 S を θ で表すと

$$S = \text{ } + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

である。

θ を $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$ の範囲で動かすとき、 S は、 $\theta = \frac{\pi}{2}$ または $\theta = \frac{3\pi}{2}$ で最小値

をとり、 $\theta = \text{ }$ で最大値 をとる。

問題 I のア, イの解答群

(a) $\frac{\theta}{3}$

(b) $\frac{\theta + \pi}{3}$

(c) $\frac{\theta + 4\pi}{3}$

(d) $\frac{\theta + 5\pi}{3}$

(e) $\frac{2\theta}{3}$

(f) $\frac{2\theta + \pi}{3}$

(g) $\frac{2\theta + 4\pi}{3}$

(h) $\frac{2\theta + 5\pi}{3}$

(i) $2\pi - \frac{\theta}{3}$

(j) $\frac{5\pi - \theta}{3}$

(k) $\pi - \frac{\theta}{3}$

(l) $\frac{2\pi - \theta}{3}$

問題 I のウの解答群

(a) $\frac{3}{4} \cos \frac{2\theta}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(b) $\frac{3}{4} \cos \frac{2\theta}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(c) $-\frac{3}{4} \cos \frac{2\theta}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(d) $-\frac{3}{4} \cos \frac{2\theta}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(e) $\frac{\sqrt{3}}{4} \cos \frac{2\theta}{3} + \frac{3}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(f) $\frac{\sqrt{3}}{4} \cos \frac{2\theta}{3} - \frac{3}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(g) $-\frac{\sqrt{3}}{4} \cos \frac{2\theta}{3} + \frac{3}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

(h) $-\frac{\sqrt{3}}{4} \cos \frac{2\theta}{3} - \frac{3}{4} \sin \frac{2\theta}{3}$

問題 I のエ, カの解答群

(a) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(c) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(e) 1

(f) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

(g) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

(h) $\sqrt{3}$

(i) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

(j) $\frac{3 + \sqrt{3}}{4}$

問題 I のオの解答群

(a) $\frac{3\pi}{4}$

(b) $\frac{9\pi}{10}$

(c) π

(d) $\frac{9\pi}{8}$

(e) $\frac{6\pi}{5}$

(f) $\frac{5\pi}{4}$

(設問は次のページにつづく)

II 次の問題文の空欄にもっとも適する答えを解答群から選び、その記号をマーク解
 用紙にマークせよ。ただし、同じ記号を2度以上用いてもよい。(20点)

a を正の定数として、

$$F(x) = \int_0^x e^{-at} \sin t \, dt$$

とおく。 $x > 0$ のとき $F(x)$ の増減を調べると、 $F(x)$ が極大となるのは n を自然数
 として $x = (2n-1)\pi$ のとき、極小となるのは $x = 2n\pi$ のときである。また、部分
 積分を行うと

$$F(\pi) = \int_0^\pi \boxed{\text{キ}} \, dt$$

となり、部分積分をもう一度行うことにより

$$\int_0^\pi \boxed{\text{キ}} \, dt = \left[\boxed{\text{ク}} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \boxed{\text{ケ}} e^{-at} \sin t \, dt$$

がわかる。したがって、 $F(\pi) = \boxed{\text{コ}}$ である。

以下では、 $S_0 = F(0) = 0$ とおき、自然数 n に対し、 $S_n = F(n\pi)$ とおく。この
 とき

$$S_{n+1} - S_n = \boxed{\text{サ}} (S_n - S_{n-1})$$

であるから、 $S_{n+1} - S_n = \left(\boxed{\text{サ}} \right)^n (S_1 - S_0)$ であり、

$$S_n = \boxed{\text{シ}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \boxed{\text{ス}}$$

となる。したがって、最初に考察した $F(x)$ の増減により、 $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \boxed{\text{ス}}$
 がわかる。

問題 II のキ, クの解答群

- (a) $-a^2 e^{-at} \cos t$ (b) $a^2 e^{-at} \cos t$ (c) $-a^2 e^{-at} \sin t$ (d) $a^2 e^{-at} \sin t$
 (e) $-a e^{-at} \cos t$ (f) $a e^{-at} \cos t$ (g) $-a e^{-at} \sin t$ (h) $a e^{-at} \sin t$
 (i) $-\frac{e^{-at} \cos t}{a}$ (j) $\frac{e^{-at} \cos t}{a}$ (k) $-\frac{e^{-at} \sin t}{a}$ (l) $\frac{e^{-at} \sin t}{a}$
 (m) $-\frac{e^{-at} \cos t}{a^2}$ (n) $\frac{e^{-at} \cos t}{a^2}$ (o) $-\frac{e^{-at} \sin t}{a^2}$ (p) $\frac{e^{-at} \sin t}{a^2}$

問題 II のケの解答群

- (a) $-a^2$ (b) $-a$ (c) $-\frac{1}{a^2}$ (d) $-\frac{1}{a}$
 (e) a^2 (f) a (g) $\frac{1}{a^2}$ (h) $\frac{1}{a}$

問題 II のコ, サの解答群

- (a) $e^{-a\pi}$ (b) $-e^{-a\pi}$ (c) $\frac{e^{-a\pi}}{2}$ (d) $-\frac{e^{-a\pi}}{2}$
 (e) $\frac{1+e^{-a\pi}}{2}$ (f) $\frac{1-e^{-a\pi}}{2}$ (g) $\frac{1-e^{-a\pi}}{a^2+1}$ (h) $\frac{1+e^{-a\pi}}{a^2+1}$
 (i) $\frac{a^2+e^{-a\pi}}{a^2+1}$ (j) $\frac{a^2-e^{-a\pi}}{a^2+1}$

問題 II のシの解答群

- (a) $\frac{1-e^{-a(n+1)\pi}}{2}$ (b) $\frac{1-e^{-an\pi}}{2}$ (c) $\frac{1-(-e^{-a\pi})^{n+1}}{2}$
 (d) $\frac{1-e^{-a(n+1)\pi}}{a^2+1}$ (e) $\frac{1-e^{-an\pi}}{a^2+1}$ (f) $\frac{1-(-e^{-a\pi})^{n+1}}{a^2+1}$
 (g) $\frac{1-(-e^{-a\pi})^n}{a^2+1}$ (h) $\frac{2^n (-e^{-a\pi})^n}{2^n (a^2+1)}$ (i) $\frac{2^n - e^{-an\pi}}{2^n (a^2+1)}$
 (j) $\frac{a^2 - (-e^{-a\pi})^n}{a^2+1}$ (k) $\frac{a^2 - e^{-an\pi}}{a^2+1}$

問題 II のスの解答群

- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{a^2}{2}$ (d) $\frac{1}{a^2+1}$ (e) $\frac{a^2}{a^2+1}$ (f) 1 (g) ∞

(設問は次のページにつづく)

III 座標平面上に、3点 $A(1, 0)$, $B(2, 1)$, $C(-1, 3)$ をとる。以下の問いに答えよ。(30点)

原点 O を通る傾き k の直線 $y = kx$ を l とする。点 A , B , C のそれぞれと直線 l との距離を a , b , c とし、

$$F = a^2 + b^2 + c^2$$

とおく。

(1) F を k で表せ。

(2) F を最小にする k の値を m とし、最大にする k の値を M とする。 m と M を求めよ。

以下では、点 P の座標が (u, v) のとき、点 $(u^2 - v^2, 2uv)$ を P' と表すことにする。点 P として点 A , B , C をとったときの P' をそれぞれ A' , B' , C' とし、 $\triangle A'B'C'$ の重心を H とする。

(3) m , M を (2) のとおりとする。点 P が直線 $y = mx$ または直線 $y = Mx$ 上にあるとき、点 P' は直線 OH 上にあることを示せ。

IV a を正の実数とする。2つの曲線

$$C_1: y = ax^3 \quad (x \geq 0), \quad C_2: y = x \log x \quad (x \geq 1)$$

がある点 P を共有し、 P におけるそれぞれの接線が一致している。このとき、以下の問いに答えよ。(30 点)

- (1) 点 P の座標と a を求めよ。
- (2) 曲線 C_1 と C_2 は P 以外に共有点をもたないことを示せ。
- (3) 曲線 C_1 , C_2 , および x 軸で囲まれた図形の面積 S を求めよ。